



národní
úložiště
šedé
literatury

**Frakcionace turmeronů z oddenku kurkumovníku dlouhého (*Curcuma longa L.*)
pomocí metod využívajících superkritický oxid uhličitý**

Topiař, Martin
2015

Dostupný z <http://www.nusl.cz/ntk/nusl-201177>

Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL).

Datum stažení: 11.04.2024

Další dokumenty můžete najít prostřednictvím vyhledávacího rozhraní nusl.cz.

Frakcionace turmeronů z oddenků kurkumovníku dlouhého (*Curcuma longa* L.) pomocí metod využívajících superkritický oxid uhličitý

M. Topiař, M. Sajfrtová, J. Karban

Ústav Chemických Procesů AV ČR, v.v.i., Laboratoř separačních procesů E. Hály, Rozvojová 135, 165 00 Praha 6, Tel.: 220 390 241, Fax: 220 920 649 E-mail: topiar@icpf.cas.cz;

Přírodní látky z rostlin často slouží jako plnohodnotná náhrada synteticky vyráběných léčiv a doplňků stravy. Izolace rostlinných výtažků se nejčastěji provádí tradičními metodami, mezi které patří hydrodestilace, soxhletova extrakce nebo macerace. Nevýhodou těchto metod je jejich nízká selektivita a možné ovlivnění chemického složení výtažků působením vysoké teploty nebo přítomnosti zbytků organických rozpouštědel v produktu po jejich odpaření. Jmenované nedostatky lze eliminovat použitím sofistikovanějších izolačních metod. Tento výzkum je zaměřen na studium superkritické extrakce oxidem uhličitým (SFE) a frakcionace turmeronů z oddenků kurkumovníku dlouhého (*Curcuma longa* L.) při použití superkritické sorpce. Sušené umleté oddenky kurkumovníku se běžně používají jako koření nebo potravinářské barvivo. Jejich hlavními biologicky aktivními složkami jsou kurkumin a turmerony (ar-turmeron, α -turmeron, β -turmeron). Studie prokázaly, že ar-turmeron vykazuje mimo jiné hepatoprotektivní¹ a protirakovinné² účinky, a bylo

by proto potřeba vyvinout vhodnou metodu pro jeho izolaci.

Cílem této práce je zakoncentrování turmeronů z oddenků kurkumovníku pomocí superkritické sorpce, metody založené na dělení extrahovaných látek pomocí sorbentu, přičemž mobilní fází je zde místo organického rozpouštědla superkritický CO₂, jehož rozpouštěcí vlastnosti závisí na jeho hustotě, kterou lze snadno ovlivnit změnami tlaku a teploty.

Při optimalizaci extrakčních podmínek za účelem získání většího množství izolátu o známém chemickém složení byl použit tlak 9-26 MPa a teplota 40-50 °C. Jako optimální podmínky pro superkritickou extrakci turmeronů z oddenků kurkumovníku byly s ohledem na jejich výtěžek a koncentraci v izolátu stanoveny tlak 9 MPa a teplota 40 °C. Za těchto podmínek byla získána koncentrovaná směs turmeronů (23,7 hm.% α -turmeronu, 17,9 hm.% ar-turmeronu a 15,4 hm.% β -turmeronu), přičemž výtěžek izolátu dosahoval 25,1 mg/g rostliny.

Superkritická sorpce byla zkoumána s ohledem na výběr vhodného sorbentu, poměru navážky izolátu k navážce sorbentu, množství proteklého CO₂ a rychlosti průtoku CO₂ kolonou. Chemické složení izolátů bylo stanoveno pomocí GC-MS a GC-FID. Nejúčinnějším sorbentem při frakcionaci izolátu byl silikagel.

Poděkování: Autor děkuje ÚCHP AV ČR, v.v.i. za finanční podporu formou interního studentského grantu.

Literatura

1. Hail, N., Jr.; Lotan, R., Cancer chemoprevention and mitochondria: targeting apoptosis in transformed cells via the disruption of mitochondrial bioenergetics/redox state. *Mol. Nutr. Food Res.* **2009**, *53* (1), 49-67.
2. Li, Y.-H.; Chung, H.-C.; Liu, S.-L.; Chao, T.-H.; Chen, J.-C., A novel inhibitory effect of *Antrodia camphorata* extract on vascular smooth muscle cell migration and neointima formation in mice. *Int Heart J* **2009**, *50* (2), 207-20.