



Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze.

Pokorná, Petra
2018

Dostupný z <http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387712>

Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL).

Datum stažení: 17.05.2024

Další dokumenty můžete najít prostřednictvím vyhledávacího rozhraní nusl.cz.

PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ZÁKLADĚ ROČNÍHO MĚŘENÍ PM_{2.5} A PM₁₀ NA DVOU MĚSTSKÝCH POZAĐOVÝCH STANICÍCH V PRAZE

Petra POKORNÁ¹, Jaroslav SCHWARZ¹, Štěpán RYCHLÍK², Hana ŠKÁCHOVÁ², Jiří SMOLÍK¹, Vladimír ŽDÍMAL¹, Ondřej VLČEK², Iva HŮNOVÁ²

¹Ústav chemických procesů, AV ČR, Praha, Česká republika, pokornap@icpf.cas.cz

²Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika

Klíčová slova: Chemické složení, Identifikace zdrojů, Positive Matrix Factorization, Ventilační index, Regionální znečištění

SUMMARY

The objective of this study was to determine air pollution origin in Prague based on the chemical composition of 24h atmospheric aerosol (AA) samples collected in parallel for one-year at two suburban sites. Chemical analysis of PM_{2.5} and PM₁₀ for elements by ICP-MS, for elemental and organic carbon by thermo-optical method and water-soluble inorganic ions by IC was performed. The AA in Prague air shed was well mixed and nine common PM₁₀ sources of local, urban, regional and long range transport (LRT) origin were apportioned.

ÚVOD

Zlepšení kvality ovzduší ve městech je možné za předpokladu pochopení základních mechanismů především pokud se jedná o AA a jeho koncentrace, zdroje a původ (Viana et al., 2008). Cílem práce bylo určit původ znečištění ovzduší v Praze na základě ročního paralelního měření AA na dvou městských pozadových stanicích.

METODY MĚŘENÍ

Odběr 24 hodinových vzorků PM_{2.5} a PM₁₀ probíhal na městských pozadových stanicích Libuš a Suchdol od dubna 2008 do března 2009. Vzorky byly analyzovány na prvkové složení (ICP-MS), organický a elementární uhlík (teplotně-optická metoda) a složení ve vodě rozpustných iontů (IC).


Za účelem vyšetření rozptylových podmínek byl počítán ventilační index umožňující postihnout dynamiku znečišťujících látek v ovzduší.

K získání chemických profilů zdrojů a jejich příspěvku k PM₁₀ byl použit model Positive Matrix Factorization (EPA PMF 5.0). K následnému zpracování výstupů z modelu byl použit program R Openair Package.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Roční průměrné koncentrace PM_{2.5} a PM₁₀ v Libuši (19.7 ± 13.0 a 26.7 ± 15.1 μgm^{-3}) byly ve schodě s koncentracemi v Suchdole (18.6 ± 22.1 a 27.1 ± 23.2 μgm^{-3}). Vzhledem k tomu, že složky tvořící většinu hmoty atmosférického aerosolu silně korelovaly ($r^2 > 80$), variabilita koncentrací PM_{2.5} a PM₁₀ byla dána především místními meteorologickými podmínkami nebo transportem znečištění.

Bylo identifikováno devět zdrojů PM₁₀, které byly následně na základě tzv. polar plots a vetilačního indexu rozděleny do čtyř kategorií dle původu. Suchdol byl více ovlivněn znečištěním z dopravy pocházející z města, zatímco v Libuši se jednalo o lokální dopravní znečištění. Na obou lokalitách bylo zjevné znečištění sekundárními sírany a dusičnaný regionálního původu spolu s vlivem dálkového transportu mořského aerosolu. Příspěvek místních zdrojů z dopravy byl zřejmý především v Libuši. Nicméně, vliv regionálního a městského znečištění na kvalitu ovzduší byl významný na obou pozadových stanicích.



Obr. 1: Podíl zdrojů na PM₁₀ odebrané v Praze v letech 2008 a 2009.

ZÁVĚRY

Atmosférický aerosol byl velmi dobře promíchán v rámci celého území Prahy a bylo identifikováno devět společných zdrojů PM₁₀ lokálního, městského a regionálního původu včetně dálkového transportu mořského aerosolu.

PODĚKOVÁNÍ

Studie byly podpořena z Norských fondů grant CZ0049 a MŠMT grant ACTRIS-CZ LM2015037.

LITERATURA

Viana, M. et al. Source apportionment of particulate matter in Europe: a review of methods and results. *Journal of Aerosol Science* 39, 827–49, (2008).